


Коклюш

ГОСТРЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ



Bordetella pertussis –
трансмисивне бактеріальне
інфекційне захворювання,
спричинене бактеріями
коклюшу.

«Надзвичайно висока контагіозність»

близько 80%
людей без імунітету
заражаються після контакту
з хворою людиною.



У 2020 році близько 20% людей
з коклюшем потребували
госпіталізації.



**ЩОРІЧНО
- ВИПАДКІВ
У ВСЬОМУ
СВІТІ**



**ЩОРІЧНО
- КІЛЬКІСТЬ
СМЕРТЕЙ
У СВІТІ**



**ЩОРІЧНО НЕВРО-
ЛОГІЧНИХ
УСКЛАДНЕНЬ
У СВІТІ**



Характерним симптомом
коклюшу є виснажливий
сухий кашель, який
триває кілька місяців,
нападоподібний кашель,
інші симптоми – фарингіт,
лихоманка,
нежить.

**У Польщі на коклюш
хворіє щорічно від 5000
до 7000 людей.**

Як запобігти?

БУСТЕРНА ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОКЛЮШУ

Персистенція антитіл з роками зменшується. Ось чому **повторні щеплення** необхідні!

Щеплення проти кашлюку **безкоштовно для дітей.**



У програмі захисних щеплень передбачається, що дітям віком від 6 років в обов'язковому порядку вводяться нагадувальні дози вакцини проти коклюшу і підліткам у віці 14 років.

Бустерна доза вакцини проти дифтерії, правця та коклюшу (протидифтерійна та коклюшова вакцина), що вводиться один раз на 10 років, рекомендована для:

- Молоді **14 або 19 років**,
- Медичного персоналу Неонатального та педіатричного відділень,
- Осіб, які контактують з немовлятами,
- Вагітних жінок.

Навіщо

робити щеплення

Ускладнення:

- гіпоксія,
- ціаноз,
- апное,
- непритомність,
- блювота,
- кровотеча з очей, носа і вух,
- розрив кровоносних судин очного яблука та обличчя,
- набряк обличчя.

Смертельні ускладнення:

- пошкодження головного мозку,
- пневмонія.